

中隔子宮(Septa Uterus)

奇美醫院 蔡永杰醫師

定義：子宮腔中間有一肌肉纖維縱隔，輕微的中隔子宮僅從子宮底有一突起，嚴重的中隔子宮可把子宮腔分為兩個獨立腔室，甚至陰道也分為兩個。

發生率：先天性子宮異常的發生率約為 3%-4%。習慣性流產的婦女中約有 25%是由先天性子宮異常所引起。中隔子宮是最常見的先天性子宮異常，約佔所有先天性子宮異常的 35%。

臨床症狀：平常並無症狀，常是婚後不孕、懷孕時造成流產、或早產就醫後才發現。發生先天性子宮異常有時會合併同一側腎臟及輸尿管缺損，臨床上要特別小心。

發病原因：胚胎發育時期，兩側苗勒氏管 (Mullerian anomalies) 的發育完成後再吸收發生問題所致。

診斷方法：子宮輸卵管攝影，或子宮腔鏡直接目視來確診。

治療：中隔子宮一般需接受手術切除，手術方法為使用手術型子宮腔鏡直接由陰道進入子宮將其切除，手術切除之後可將流產率從百分之九十降為百分之十。有些先天性子宮異常不一定要治療，如雙套子宮、單角子宮。治療原則是減少流產率、早產率，提高活產率，並減少經血逆流，避免經痛為主。治療上可以針對不同異常進行不同的子宮整型手術或子宮腔鏡切除子宮內的隔膜，療效還不錯。

